

## 予防接種の記録(3)

日本脳炎 Japanese Encephalitis				
時 期	接種年月日 Y/M/D (年 齢)	メーカー/ロット Manufacturer/ Lot. No.	接種者署名 Physician	備 考 Remarks
第1期 初 回	1回	⑨【1回目:3歳児】	※6日以上28日の間隔	
	2回	⑩【2回目:3歳児】		
第1期追加		⑪【第1期追加:4歳児】	※初回終了後6か月以上 おおむね1年の間隔で	
第2期		⑬【第2期:9歳児】		

ワクチンの種類 Vaccine	接種年月日 Y/M/D (年 齢)	メーカー/ロット Manufacturer/ Lot. No.	接種者署名 Physician	備 考 Remarks
ヒトパピローマ ウイルス (HPV) Human Papilloma (2価・4価)	1回			
	2回			
	3回			

●薬剤や食品などのアレルギー記入欄

日本脳炎ワクチンは基本的には3歳から接種開始になります。接種間隔がわかりにくいこと、接種を控えていた時期があるため、やむを得ず未接種になっている場合があります。標準接種から外れている場合でも、経過措置として定期接種扱いで接種券を使用できる場合がありますので、お問い合わせください。

## 予防接種の記録(4)

ワクチンの種類 Vaccine	接種年月日 Y/M/D (年 齢)	メーカー/ロット Manufacturer/ Lot. No.	接種者署名 Physician	備 考 Remarks
ロタウイルス Rotavirus  自費ワクチン	①【1回目:2か月児】			
	②【2回目:3か月児】			
	③【3回目:4か月児】			
おたふくかぜ Mumps 自費ワクチン	⑦【1回目:1歳児】			
	⑫【2回目:年長さんになったら】			
インフルエンザ Influenza				

※ロタウイルスワクチン・おたふくかぜワクチンは【**自費**】ワクチンですが、集団生活を送る上で重要なので、積極的に推奨しております。

※ロタワクチンは当院では「ロタテック」を採用しております。

初回接種は6週齢以上とし、4週以上の間隔をおいて32週齢までに3回経口接種を行います。なお、初回接種は生後14週6日までに行うことが推奨されていますので、上記のように他のワクチンと同時に going to do it.